

日本における高病原性鳥インフルエンザの確認状況

平成23年2月28日

■ : 家きん
■ : 家きん以外の鳥類
■ : 野鳥

<平成22年>
 12月 富山県高岡市（動物園のコブハクチョウ）
 <平成23年>
 2月 兵庫県加東市（公園のコブハクチョウ）
 山口県宇部市（公園のコクチョウ）

<平成23年> H5N1亜型（強毒）
 2月 大分県大分市
 （1農場 約1万羽）

<平成22年> H5N1亜型（強毒）
 11月 島根県安来市
 （1農場 約2万羽）

<平成23年> H5N1亜型（強毒）
 1月 宮崎県宮崎市（佐土原町）、新富町、
 都農町、川南町、延岡市（北川町）、
 高鍋町、宮崎市（高岡町）
 2月 高千穂町、都農町、門川町、
 宮崎市（高岡町）、延岡市（北浦町）
 （12農場 約99万羽）

<平成23年> H5N1亜型（強毒）
 1月 鹿児島県出水市
 （1農場 約8,600羽）

<平成23年> H5N1亜型（強毒）
 2月 和歌山県紀の川市
 （1農場 約12万羽）

<平成23年> H5N1亜型（強毒）
 1月 愛知県豊橋市
 2月 新城市
 （2農場 約17万羽）

<平成23年> H5N1亜型（強毒）
 2月 三重県紀宝町、南伊勢
 （2農場 約33万羽）

<平成22年>
 10月 北海道稚内市（カモの糞）
 12月 鳥取県米子市（コハクチョウ）
 鹿児島県出水市（ナベヅル）
 <平成23年>
 1月 福島県郡山市（キンクロハジロ）
 島根県松江市（キンクロハジロ）
 北海道浜中町（オオハクチョウ等）
 兵庫県伊丹市（ホシハジロ・カイツブリ）
 福島県郡山市（キンクロハジロ）
 高知県仁淀川町（オシドリ）
 鳥取県米子市（ユリカモメ・キンクロハジロ）
 北海道浜中町（オオハクチョウ）
 2月 長崎県長崎市（オシドリ）
 北海道浜中町（オオハクチョウ）
 山口県宇部市（キンクロハジロ）
 福島県福島市（コハクチョウ）
 徳島県那賀町（フクロウ）
 大分県中津町（オシドリ）
 宮崎県諸塚村（カイツブリ）
 長崎県諫早市（ハヤブサ）
 大分県大分市（オシドリ）
 宮崎県宮崎市（ハヤブサ）
 鹿児島県出水市（ナベヅル）
 栃木県宇都宮市（ハヤブサ）
 京都府精華町（ハヤブサ）
 大分県大分市（アオサギ）
 宮崎県日南市（オシドリ）
 宮崎県延岡市（ハヤブサ）
 宮崎県宮崎市（オシドリ）