

Versió executiva de la *Guia tècnica per a la campanya de vacunació antigripal 2019-2020*

Data d'inici de la campanya

La campanya de vacunació començarà el dilluns 28 d'octubre de 2019.

Més informació

[Material relacionat amb la campanya](#)

Composició de la vacuna

En la composició de la vacuna trivalent d'aquesta temporada es manté la soca B/Colorado/06/2017 (l'inatge Victòria), i la resta de soques han variat. La composició de les vacunes trivalents per a aquesta temporada, d'acord amb les recomanacions de l'OMS per a la temporada gripal 2019-2020 a l'hemisferi nord, ha d'incloure:

- **A/Brisbane/02/2018 (H1N1)pdm09**
- **A/Kansas/14/2017 (H3N2)**
- B/Colorado/06/2017 (l'inatge B/Victòria/2/87)

L'OMS recomana que les vacunes antigripals tetravalents portin, com en la temporada anterior, a més de les soques incloses a la trivalent, una soca anàloga a B/Phuket/3073/2013 (l'inatge B/Yamagata/16/88). Aquesta soca també hi era a la temporada passada.

Font : [Recommended composition of influenza virus vaccines for use in the 2019-2020 northern hemisphere influenza season](#)

Grups de risc que cal vacunar

1. Persones d'edat igual o superior a 60 anys. Cal fer èmfasi especial en el cas de persones que conviuen en institucions tancades.

2. Persones de menys de 60 anys que presenten un risc alt de complicacions derivades de la grip:

- Infants (a partir dels 6 mesos) i adults amb malalties cròniques cardiovasculars (exclosa la hipertensió arterial aïllada), neurològiques o respiratòries (inclòs l'asma, la displàsia broncopulmonar i la fibrosi quística).
- Infants (a partir dels 6 mesos) i adults amb:
 - diabetis mellitus

- obesitat mòrbida (índex de massa corporal ≥ 40 en adults, ≥ 35 en adolescents o ≥ 3 DE en la infància)
- malaltia renal crònica i síndrome nefròtica
- hemoglobinopaties i anèmies
- hemofília i trastorns hemorràgics crònics, i també receptors d'hemoderivats i transfusions múltiples
- asplènia o disfunció asplènica greu
- malaltia hepàtica crònica, inclòs l'alcoholisme crònic
- malalties neuromusculars greus
- immunosupressió (incloses les immunodeficiències primàries, originada per infecció pel VIH, per fàrmacs —inclòs el tractament amb eculizumab—, persones receptores de trasplantaments i el dèficit del complement)
- càncer i hemopaties malignes
- implant coclear o en espera de l'implant
- fístula de líquid cefalorraquidi
- malaltia celíaca
- malaltia inflamatòria crònica
- trastorns i malalties que comporten disfunció cognitiva: síndrome de Down, demències i altres.

En aquest grup cal fer èmfasi especial en el cas de persones que necessitin seguiment mèdic periòdic o que hagin estat hospitalitzades l'any precedent.

- Infants i adolescents, de 6 mesos a 18 anys, que reben tractament prolongat amb àcid acetilsalicílic, per la possibilitat de desenvolupar una síndrome de Reye després de la grip.
- Persones de qualsevol edat (> 6 mesos) institucionalitzades de manera perllongada.
- Dones embarassades en qualsevol trimestre de gestació.
- Infants entre els 6 mesos i 2 anys d'edat amb antecedents de prematuritat (de < 32 setmanes de gestació)

3. Persones que poden transmetre la grip a d'altres que tenen un risc alt de presentar complicacions:

- Personal dels centres, serveis i establiments sanitaris, tant d'atenció primària com especialitzada i hospitalària, pública i privada, així com el personal de les oficines de farmàcia. S'ha de fer èmfasi especial en el personal que atén pacients d'alguns dels grups d'alt risc descrits.
- Persones que treballen en institucions geriàtriques o en centres d'atenció a malalts crònics, especialment els que tinguin contacte continu amb persones vulnerables.

- Estudiants en pràctiques en centres sanitaris.
- Persones que proporcionin cures domiciliàries a pacients d'alt risc o gent gran (definites als apartats 1 i 2).
- Persones que conviuen a la llar, inclosos infants a partir dels 6 mesos d'edat, amb d'altres que pertanyen a algun dels grups d'alt risc per la seva condició clínica especial (esmentades al punt 2).

4. Altres grups als quals es recomana la vacunació:

- Persones que treballen en serveis públics essencials, especialment en els subgrups següents:
 - Forces i cossos de seguretat de l'Estat, amb dependència nacional, autonòmica o local
 - Bombers
 - Serveis de protecció civil
 - Serveis d'emergències sanitàries
 - Institucions penitenciàries i altres centres d'internament per resolució judicial (inclosos centres d'acolliment d'immigrants)
- Persones amb exposició laboral directa a aus domèstiques o porcs, en granges o explotacions avícoles o porcínes, i també a aus salvatges. La finalitat és reduir l'oportunitat de coinfecció de virus humà i aviari o porcí, i disminuir la possibilitat de recombinació genètica d'ambdós virus.

Es recomana que a les persones que pertanyen al grup de serveis públics essencials els vacuin els mateixos serveis sanitaris que els corresponguin.

Malgrat l'existència de recomanacions d'algunes institucions, es recorda que per a la campanya antigripal 2019-2020 no es considera grup de risc –a l'efecte de rebre vacunació antigripal de manera sistemàtica– la població sana infantil o adulta menor de 60 anys, no inclosa en els apartats 1, 2 i 3.

Com a novetat, aquesta temporada s'ha afegit entre els grups de risc els **infants d'entre 6 mesos i 2 anys d'edat amb antecedents de prematuritat (de < 32 setmanes de gestació)**.

Vacunes distribuïdes pel Departament de Salut per a la campanya de vacunació 2019-2020

La Generalitat de Catalunya adquireix les vacunes mitjançant un concurs públic. En el concurs d'aquest any, els lots de vacunes que s'han adjudicat són els següents:

Vacunes trivalents

- 600.000 dosis de vacuna Chiroflu® de Seqirus
Vacuna antigripal d'antigen de superfície, inactivat.

Vacunes trivalents d'immunogenicitat reforçada

- 600.000 dosis de vacuna Chiomas® de Seqirus
Vacuna antigripal d'antigen de superfície, inactivat, amb adjuvant MF59C.1.

Vacunes tetravalents

- 18.000 dosis de vacuna Vaxigrip Tetra® de Sanofi
Vacuna antigripal tetravalent de virus fraccionats, inactivats.
- 2.000 dosis de vacuna Flucelvax Tetra® de Seqirus
Vacuna antigripal d'antigen de superfície, inactivat, preparada en cultius cel·lulars.

Les vacunes Chiroflu® i Chiomas® es distribuïran amb agulles amb sistemes de bioseguretat servides en caixes independents:

- Chiroflu®: amb agulla de bioseguretat de color taronja.
- Chiomas®: amb agulla de bioseguretat de color blau.

Vegeu la indicació d'ús de la vacuna antigripal per tipus a la taula 1.

Taula 1. Indicació d'ús de la vacuna antigripal per tipus de vacuna

Nom comercial	Edat recomanada	Via d'administració (fitxa tècnica)	Tipus de vacuna	Població destinatària
Chiroflu®	A partir dels 6 mesos	Intramuscular o subcutània profunda	Subunitats	Totes les persones amb indicació de vacunació
Chiromas®	A partir dels 65 anys (No hi ha estudis que validen la seva administració abans d'aquesta edat)	Intramuscular	Subunitats d'Immunogenicitat reforçada (adjuvada)	Utilitzar en persones ≥ 65 anys Prioritzar-ne l'ús en les persones d'edat més avançada i també en els ≥ 65 anys amb altres factors de risc
Vaxigrip Tetra®*	A partir dels 6 mesos	Intramuscular o subcutània	Fraccionada tetravalent	• Personal sanitari en contacte amb pacients d'alt risc (hematologia, oncologia, transplantament...) i aquests pacients <65 anys • Dones embarassades amb altres factors de risc per patir complicacions derivades de la grip • Pacients <65 anys amb factors de risc amb patologia greu
Flucelvax Tetra®*	A partir dels 9 anys	Intramuscular	Subunitats tetravalent de cultiu cel·lular	• Personal sanitari en contacte amb pacients d'alt risc (hematologia, oncologia, transplantament...) i aquests pacients <65 anys • Dones embarassades amb altres factors de risc per patir complicacions derivades de la grip • Pacients <65 anys amb factors de risc amb patologia greu

* Aquesta campanya es disposa de 20.000 dosis de vacunes tetravalents, aquestes vacunes amplien la possibilitat de cobertura sobre les possibles soques circulants a la temporada gripal. Per aquest motiu es prioritza l'ús d'aquestes vacunes en grups on la vacunació pot tenir un major impacte